

FICHE D'INFORMATION PATIENTS : DABRAFENIB+TRAMETINIB - TAFINLAR®+MEKINIST®

(Mise à jour : 2023)



50 mg



75 mg



0,5 mg



2 mg

De quel type de traitement s'agit-il ?

Il s'agit d'une association de thérapies ciblées c'est à dire de traitements qui ciblent une anomalie (ou mutation) présente dans vos cellules cancéreuses. A la manière d'une clé, le traitement bloque la serrure, et empêche ainsi l'activité et le renouvellement des cellules cancéreuses.

Quelles sont les modalités d'administration du traitement ?

Les comprimés de TAFINLAR® doivent être pris tous les jours, 2 fois par jour, le matin et le soir.

Les comprimés de MEKINIST® doivent être pris une fois par jour.

La prise du TAFINLAR et du MEKINIST se fait à heure fixe, en dehors des repas (1h avant ou 2h après le repas).

Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur. Ne pas écraser, mâcher, sucer ou couper les comprimés. Toujours se laver les mains à l'eau savonneuse avant et après manipulation de ces médicaments et après être allé aux toilettes.

Que dois-je faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

-TAFINLAR® : prendre la dose oubliée dès que possible sauf si la dose suivante (celle du lendemain) est prévue dans les 6 prochaines heures ; dans ce cas, ne pas prendre la dose manquée et poursuivre le traitement à l'heure et à la dose habituelles de la prise suivante (ne pas doubler la dose).

-MEKINIST® : prendre la dose oubliée dès que possible sauf si la dose suivante est prévue dans les 4 prochaines heures ; dans ce cas, ne pas prendre la dose manquée et poursuivre le traitement à l'heure et à la dose habituelle de la prise suivante (ne pas doubler la dose).

En cas de vomissement, ne pas prendre de dose supplémentaire, attendre la dose suivante.

Quels sont les principaux effets indésirables de ce traitement ? et que faire s'ils surviennent ?
Il est important que vous les connaissiez pour que vous puissiez avertir l'équipe soignante lors de leur survenue. L'équipe vous guidera dans la gestion de ces effets secondaires.

Effets indésirables	Précautions à prendre	Que faire ?
Fatigue, fièvre	Surveiller sa température Bien s'hydrater (1,5l d'eau par jour) Maintenir une activité physique quotidienne Se fixer des priorités	Si fièvre >38°C : paracétamol (1g toutes les 6 heures (max 4g/jour) + contrôler la température. Si une fièvre >38°C persiste plus de 24 à 48h, contacter votre médecin traitant ou le service.
Nausées, vomissements	Fractionner l'alimentation en 5-6 repas, alimentation à température ambiante, boire par petites gorgées en dehors des repas. Ne pas s'allonger dans les 30 min suivant le repas	Métoclopramide (Primpéran®) Surveillance du poids Si perte de poids de + de 2kg, contacter votre médecin traitant ou le service.
Problèmes cutanés : éruption cutanée, sécheresse cutanée, épaissement de la peau des plantes et/ou des paumes parfois douloureuse	Bien hydrater la peau avec des crèmes émoullientes, gel douche sans savon ou pain surgras, toilette sans gant, séchage sans frotter. Chaussures larges et confortables, si douleurs palmoplantaires, bain d'eau fraîche Surveillance de sa peau et signaler l'apparition de toute nouvelle lésion ou modification d'une lésion préexistante	Éviter bains chauds, travaux irritants Pour les mains et les pieds : soins pédicure et manucure, bien hydrater vos pieds, crème à l'urée. Si éruption cutanée : plaques rouges, démangeaisons, gonflements, sensation de brûlures, contacter votre médecin traitant ou le service.

Diarrhées	Boire 2L par jour (eau, thé, bouillon...), consommer des viandes blanches, poissons maigres, riz, carotte, banane, pâte de coing, fromage à pâte cuite... Eviter les repas épicés ou riches en graisse, caféine, boissons glacées, lait, crudités, céréales, légumineuses pain complet, boissons gazeuses, édulcorants.	Anti diarrhéique Smecta® (respecter un intervalle de 2h avec tout autre médicament et alimentation), Lopéramide (Imodium®) Si + de 6 selles/jour ou perte de poids de + de 2 kg, contacter votre médecin traitant ou le service
Maux de tête, douleurs articulaires, musculaires	S'assurer d'avoir une literie adaptée, boire régulièrement, privilégier les exercices légers et éviter les gestes répétitifs	Utiliser un antalgique (paracétamol) et consulter votre médecin traitant.
Problèmes de vision (flou visuel, sensation de mouches devant les yeux...°		En cas de troubles visuels, consulter rapidement un ophtalmologue

Une élévation de la tension artérielle, un essoufflement à l'effort et des anomalies de la prise de sang (anémie, élévation des enzymes hépatiques, élévation des enzymes musculaires (CPK)) peuvent survenir pendant le traitement. Ne pas hésiter à contacter votre médecin

Quelles sont les autres consignes à respecter ?

- Stocker hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux domestiques, à l'écart des autres médicaments du foyer et de toute nourriture. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité, à température ambiante. Ne pas sortir les comprimés de la boîte pour les mettre dans un pilulier.
- Le TAFINLAR/MEKINIST augmente l'élimination de certains médicaments (notamment les anticoagulants, la pilule contraceptive...). Donnez la liste de vos médicaments, plantes ou tisanes, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin, évitez l'automédication (y compris phytothérapie, probiotiques...) et signaler la prise de TAFINLAR/MEKINIST lors de la mise en route de tout nouveau traitement.
Le millepertuis, le pamplemousse et les oranges sanguines de Séville ne doivent pas être consommés en cours de traitement.
Ne prenez aucun médicament sans interroger votre médecin ou votre pharmacien.
- Attention, un intervalle de 2h est recommandé entre la prise de TAFINLAR/MEKINIST et les médicaments utilisés pour soulager les douleurs d'estomac (Gaviscon, Maalox, Xolaam, Phosphalugel ...), les médicaments contenant du charbon ou de l'argile utilisés pour soulager les ballonnements (Carbolevure, Carbosylane, Bedelix).
- En cas de geste invasif (chirurgie, radiothérapie), le traitement pourra être stoppé quelques jours avant et après l'intervention. Parlez-en à votre médecin.
- Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- Que vous soyez un homme ou une femme, ce médicament est susceptible d'altérer votre fertilité et nécessite une méthode de contraception efficace pendant le traitement et les mois suivant le traitement ; il contre-indique les dons de sperme. Parlez-en à votre médecin.

Il est possible de vous faire vacciner normalement contre la grippe et le COVID

Comment sera évaluée l'efficacité de ce traitement ?

Un examen d'imagerie du corps entier (par scanner, TEP scanner et/ou IRM cérébrale) sera réalisé tous les 3 mois environ.